

Tabla 16. Pinguicula longifoliae-Caricetum brachystachys Chouard 1942 ramondetosum myconis Bentó 2004 (invs. 1-12) y typicum (invs. 13-28)

Inventario	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[SIN]
Altitud (m)	2000	1650	1670	1510	1600	1675	1615	1475	1765	1750	1900	1600	2000	1685	1850	1335	1435	1085	835	1130	1100	1250	1170	1120	1820	1335	1625		
Orientación	W	S	N	NE	W	W	W	SW	SW	E	NE	SW	E	SW	E	NE	SW	E	NE										
Inclinación (%)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cobertura total (%)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Área (m <sup>2</sup> )	-	10	20	15	20	20	8	3	15	60	30	25	10	30	5	30	100	40	50	40	90	75	60	1	1	2	-		
Características de asociación y alianza (Viola-Cystopteridion)																													
<b>Pinguicula longifolia</b>	2	2	3	3	2	2	2.2	2.1	4.4	2	2	3	1.2	2	1.1	1.2	2.3	3.1	3	2	2.1	1.1	4.3	3.3	4.2	V			
<b>Carex brachystachys</b>	1	+	+	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<b>Hypericum nummulatum</b>	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Viola biflora</b> (Alianza)																													
Diferencias de subasociación ramondetosum																													
<b>Ranuncula myconi</b>	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<b>Lonicera pyrenaica</b>	+	1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<b>Erinus alpinus ssp. alpinus</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<b>Saxifraga longifolia longifolia</b>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<b>Asplenium trichomanes pacyrastris</b>	-	1	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Asplenium viride</b>	-	1	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Cystopteris fragilis</b>	-	1	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Asplenium ruta-muraria</b>	-	1	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Poemiumia achimilloides</b>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Accompañantes																													
<b>Saxifraga aizoides</b>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Sesleria alpina</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Campanula cochlearifolia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Gymnocarpium robertianum</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Características de orden (Viola-Cystopteridetalia) Y clase (Asplenietalia trichomanis) presentes en menos de tres inventarios: <i>Agrostis schleicheriana</i> en 4 y 8(+)21; <i>Asperula hirta</i> en 4; <i>Kernera saxatilis</i> en 1 y 5; <i>Sedum dasypyllyum desyphylum</i> en 1; <i>Silene pusilla</i> en 15(2); <i>Silene saxifraga</i> en 1 y 16(1).																													
Características de orden (Hieracium cordifolium ericinanthinae) en 15; <i>H. laevigata</i> en 23; <i>H. phoenicea</i> en 19(1) y 20; <i>H. saxifraga</i> en 1; <i>Agrostis stolonifera</i> en 24; <i>Campanula rotundifolia</i> en 8; <i>Cordulia t. tenuirostra</i> en 24; <i>Epilobium angustifolium</i> en 22; <i>Eupatorium cannabinum cannabinum</i> en 22; <i>Fragaria moschata</i> en 23(1); <i>Geum urbanum</i> en 22; <i>Palisota apina</i> fontana-querci en 2; <i>Palisota apina</i> fontana-querci en 3; <i>Poa nemoralis glauca</i> en 3; <i>Poa communis</i> en 22(1) y 25(1); <i>Tolédia calycina</i> en 25.																													
Accompañantes presentes en menos de tres inventarios: <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> en 11; <i>Buxus sempervirens</i> en 24; <i>Campanula pallens</i> en 23; <i>Panmasia palustris</i> en 23; <i>Globularia nudicaulis</i> en 25.																													
Localidades:																													
1 [P00780]; A. Fano, Afonso, arroyo de la confluencia con el río de la Fuente Blanca, BH6925, (QUÉZEL, 1956: 185)																													
2 [P00007]; O. Tofia, Sáenz, YN2, (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1990b: 367)																													
3 [P00001]; O. Tofia, Sáenz, YN2, (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1990b: 367)																													
4 [P00002]; O. Tofia, valle de Oresia, YN2, (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1990b: 367)																													
5 [P00003]; O. Tofia, valle de Oresia, YN2, (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1990b: 367)																													
6 [P00002]; O. Tofia, valle de Oresia, YN2, (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1990b: 367)																													
7 [P00423]; O. Tofia, Cuenca Frichanal, BH5224, 14-VII-1998, J.B. 140798A, <i>Ypsilon</i>																													
8 [P00420]; O. Tofia, Senda de Cazadores, YN4425, 12-X-1998, J.B. 020698B, <i>Ypsilon</i>																													
9 [P00431]; O. Tofia, fondo de Sáenz, camino hacia la Faja de Pelejo, BH5224, 14-VII-1998, J.B. 140798D1																													
10 [P00424]; O. Tofia, fondo de Sáenz, en la foz del río de Sáenz, YN4425, 12-VII-1998, J.B. 140798E, <i>Ypsilon</i>																													
11 [P00780]; O. Tofia, cerca de la Fuente Blanca, margen hacia la ribera del valle BH5224, (QUÉZEL, 1956: 185)																													
12 [P00781]; A. Fano, arroyo de la Fuente Blanca, margen hacia la ribera del valle BH5224, (QUÉZEL, 1956: 185)																													
13 [P00691]; O. Tofia, senda de Caridores, YN4425, 12-X-1998, J.B. 181096B, <i>Ypsilon</i>																													
14 [P00789]; A. Fano, arroyo de la Pardina, margen izquierda, c. de la surgencia cogizada, BH5723, (QUÉZEL, 1956: 185)																													