

Tabla 26. **Festucetum glaciali-pyrenaicae** Rivas-Martínez 1977 **allietosum schoenoprasii** (Fdez. Casas 1970) Benito 2004 var. **typicum** (invs. 1-9) y var. de **Festuca scoparia** Benito var. nova (invs. 10-12)

Inventario	P00715	P00714	FC001	P00716	FC003	P00718	P00717	FC002	FC004	P10460	P10011	FC005	
N.º de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[Sin]
Altitud (m)	2400	2700	2350	2450	2400	2250	2300	2360	2360	2345	2405	2350	
Orientación	SO	O	N	O	E	NO	N	SW	SW	NE	S	NW	
Inclinación (º)	20	10	5	15	2	35	15	3	-	15	<5	5	
Cobertura total (%)	25	25	-	40	-	25	30	-	-	15	20	-	
Área (m <sup>2</sup> )	10	20	30	50	50	100	40	10	10	50	65	-	
Características de asociación													
<i>Allium schoenoprasum schoenoprasum</i> (dif. subasoc.)	2	1	2.2	2	2.1	3	3	1.1	3.2	(+)	2.1	3.2	V
<i>Festuca pyrenaica</i>	1	1	+	1	1.1	+	1	.	.	1.2	1.2	.	IV
<i>Festuca glacialis glacialis</i>	1	+	.	2	+.2	+	+	.	.	.	.	.	III
Características de unidades superiores													
<i>Ranunculus pannassifolius heterocarpus</i>	2	3	2.2	3	1.1	2	2	3.2	+	1.1	2.1	1.1	V
<i>Carduus carlinoides carlinoides</i>	+	.	+	+	1.1	+	+	+	+	.	.	.	IV
<i>Galium pyrenaicum</i>	1	1	.	+	+	.	.	.	.	+2	+3	.	III
<i>Linaria alpina alpina</i>	+	+	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	III
<i>Campanula cochlearifolia</i>	.	.	+	.	+	.	.	+	.	.	.	.	II
<i>Saxifraga aizoides</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+2	.	II
<i>Crepis pygmaea pygmaea</i>	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	II
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.2	+2	.	II
Diferenciales de la var. de <i>Festuca gautieri scoparia</i>													
<i>Arenaria purpurascens</i>	.	.	+	.	+	.	.	+	.	1.2	+2	.	III
<i>Festuca gautieri scoparia</i>	+	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	2.2	3.3	II
<i>Helictotrichon sedenense</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+	.	I
<i>Oxytropis campestris campestris</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+2	+2	.	I
<i>Brassica repanda</i> s.l.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1.1	.	.	I
Acompañantes													
<i>Thymus gr. serpyllum</i>	+	.	+	+	.	+	+	+	+	+2	+2	+	V
<i>Poa alpina</i>	+	+	+	+	.	2	+	+	+	1.1	.	+	IV
<i>Seseli montanum</i>	2	1	+	+	+	+	+	+	.	.	.	.	III
<i>Hieracium lactucella</i>	.	.	+	+	.	+	.	+	+	.	.	+	III
<i>Sedum atratum atratum</i>	+	.	.	.	+	+	+	+	.	.	.	+	II
<i>Paronychia kapela serpyllifolia</i>	+	.	.	.	+.2	+	.	+	.	.	.	.	II
<i>Trifolium thalii</i>	+	.	.	.	.	+	.	+	+	.	.	.	II
<i>Arenaria moehringioides</i>	+	.	+	.	+	.	+	+	.	.	.	.	II
<i>Koeleria vallesiana vallesiana</i>	.	+	.	.	+	+	+	.	.	.	.	.	II
<i>Sedum alpestre</i>	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	.	+	II

Características: *Doronicum grandiflorum grandiflorum* en 12; *Saxifraga praetermissa* en 12; *Veronica nummularia nummularia* en 8(2.2).

Acompañantes: *Acinos alpinus* en 6; *Draba aizoides aizoides* en 5; *Euphrasia* en 5; *Festuca nigrescens* en 6; *Geranium cinereum* en 3; *Leontodon pyrenaicus pyrenaicus* en 10; *Oxytropis neglecta* en 2; *Saxifraga moschata* en 6; *Sedum acre* en 6(1) y 7; *Silene acaulis* en 5(+.2) y 9; *Taraxacum dissectum* en 7; *Thalictrum alpinum* en 9 y 12; *Thymelaea tinctoria nivalis* en 6.

#### Localidades:

- 1 [P00715]: O, Fanlo, Monte Perdido, BH5528, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 2 [P00714]: O, Fanlo, Monte Perdido, BH5528, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 3 [FC001]: O, Fanlo, de Góriz al Monte Perdido, BH5528, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 296)
- 4 [P00716]: O, Fanlo, Marboré, BH53, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 5 [FC003]: O, Fanlo, de Góriz al Monte Perdido, BH5528, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 296)
- 6 [P00718]: O, Fanlo, Góriz, BH5528, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 7 [P00717]: O, Fanlo, Góriz, BH5528, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 22)
- 8 [FC002]: O, Fanlo, de Góriz al Monte Perdido, BH5528, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 296)
- 9 [FC004]: O, Fanlo, de Góriz al Monte Perdido, BH5528, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 296)
- 10 [P10460]: A, Fanlo, Cuello de Arrabio, BH5626, 15-VII-1999, JLB, 150799B
- 11 [P10011]: A, Fanlo, bajo el Morrón de Arrabio, BH5727, 15-VII-1999, JLB, 150799D
- 12 [FC005]: O, Fanlo, de Góriz al Monte Perdido, BH5528, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 296)