

Tabla 28. *Minuartio cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae* Chouard 1943 (invs. 1-31); *Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae* Rivas-Martínez 1988 (invs. 32-34)

[illegible]

Características: *Arabis alpina* en 31(+2); *Campanula cochlearifolia* en 2, 6; *Carduus cefaloides* cañinoides en 2, 8; *Doronicum grandiflorum grandiflorum* en 8; *Festuca glacialis glacialis* en 2(+2); *Festuca pyrenaica* en 3(+2), 6; *Gallium cometerizon* en 2; *Gallium pyrenaicum* en 2(3,3), 10; *beris spathulata* en 2; *Rumex scutatus* en 8; *Saxifraga praetermissa* en 23(+2).

Acompañantes: *Agrostis alpina* en 7(+2), 21(+2); *Alchemilla alpina alpina* en 13; *Campanula rotundifolia* en 13; *Carex parviflora* en 15; *Helictotrichon sedenense* en 17, 33; *Minuartia verna* en 5(+2); *Minuartia villarii* en 4; *Oxytropis neglecta* en 2(+2); *Phyteuma hemisphaericum* en 33; *Potentilla crantzii* en 33; *Scirpus scitroides* en 14; *Sedum atratum atratum* en 3(+1); 4; *Semnervium montanum montanum* en 9(+3); 33(+3); *Thymus serpyllum* en 2(+2); 4; *Valeriana acule* en 5(+2); 21; *Vernicia arbihae* en 11(+1).

[illegible]