

Tabla 66. *Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae* Br.-Bl. ex Br.-Bl. & Susplugas 1937 **typicum**

Inventario	BI0172	PI0317	PI0185	PI0315	BI0372	PI0316	BI0432	PI0183	PI0308	PI0182	PI0556
N.º de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Altitud (m)	1450	1300	1450	1060	1390	1085	1260	1460	1355	1475	1550
Orientación	ESE	SE	SE	E	S	NE	NE	E	E	E	NE
Inclinación (°)	25-30	30	30	40	40	40	10-15	20	10	15	35
Cobertura arbóreo (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	90	100	95
Altura arbóreo (m)	<20	10	20	10	18-22	12-14	20-30	-	20	-	8-10
Cobertura arbustivo (%)	60-70	50	30	70	60	80	35	25	50	25	-
Altura arbustivo (m)	1-8	4	2-3	2	1,5-4	3	1-5	-	1-4	-	-
Cobertura herbáceo (%)	25	60	25	85	25	50	5	20	40	-	75
Área (m ²)	100	200	50	100	150	100	100	80	70	50	100
Características de asociación, alianza (<i>Fagion</i>) y orden (<i>Fagetalia</i>)											
<i>Fagus sylvatica</i>	5.4	4.3	5.4	5.5	5.5	5.5	5.1	5.4	5.4	5.4	4.5
<i>Fagus sylvatica</i>	1.1	1	1	+	1.1	2	1.1	+	1.2	1.2	.
<i>Prenanthes purpurea</i>	+	+	+	.	.	(+)	.	1.1	.	.	.
<i>Fraxinus excelsior</i>	.	.	.	+	1.1	(+)	1
<i>Abies alba</i>	1	.	+	1	2.2	.	.
<i>Helleborus viridis</i>	.	.	.	+	.	.	.	+	.	1.2	.
<i>occidentalis</i>
Diferenciales de asociación (Características de <i>Quercetalia pubescentis</i>)											
<i>Buxus sempervirens</i>	2.2	3.3	3	4	4.3	5	3.2	2.2	+2	2.2	.
<i>Daphne laureola</i>	+	+2	+	+	.	.	+	+2	.	.	+
<i>Helleborus foetidus</i>	+	+	+	+
<i>Sorbus aria</i>	+	+	+	+	.	.	.
<i>Lonicera xylosteum</i>	+	.	+	+	.	.	+
<i>Acer opalus opalus</i>	.	.	1	.	.	+	.	.	+	.	.
<i>Epipactis helleborine</i>	+	.	.	.	+
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	.	+	.	+	+
Características de clase (<i>Quercio-Fagetea</i>)											
<i>Viola gr. sylvestris</i>	1	1.1	+	+	2.1	+	+	1.1	+	1	1.1
<i>Hepatica nobilis</i>	2.2	2.2	2.1	1.1	2.2	2.1	+	1.2	.	1.2	+
<i>Carex digitata</i>	1.1	2.2	+	1.1	2	1.1	.	.	.	+2	.
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	.	+	+2	1.1	+	+	1.2
<i>Corylus avellana</i>	1.1	1	.	1	+	1
<i>Mycelis muralis</i>	.	+	+	+	.	.	+
<i>Taxus baccata</i>	1.1	3	1
<i>Poa nemoralis nemoralis</i>	+2	.	+	+
<i>Ilex aquifolium</i>	+	1.1	+
<i>Crataegus monogyna</i>	+	+
Acompañantes											
<i>Hieracium murorum</i>	+	1.1	+	+	1	(+)	.	+	.	+	.
<i>Fragaria vesca</i>	1.2	+	+	+	1.2	+
<i>Hedera helix helix</i>	+	+	+	5.4	.	3
<i>Polypodium vulgare</i>	+	+	+	.	+	.	.	.	+	.	.
<i>Pinus sylvestris</i>	1.2	3.3	2.3	.	2.1
<i>Polystichum aculeatum</i>	.	.	.	+	.	+2	1.1	.	+	.	+
<i>Asplenium trichomanes</i>	.	+2	+	+	+	.
<i>Laserpitium latifolium</i>	.	.	+	+	+	+
<i>latifolium</i>
<i>Vicia sepium</i>	+	1.1	+
<i>Epipactis atrorubens</i>	.	+	1.1	+
<i>Juniperus communis</i>	+	+	.	.	+
<i>Sorbus aucuparia</i>	+	2	1
<i>Veronica officinalis</i>	+	+2
<i>Solidago virgaurea</i>	+	.	.	.	+	+
<i>Oxalis acetosella</i>	+	.	.	2.2	.	2.3
<i>Polystichum setiferum</i>	+	.	.	+	.	+

Características de asociación alianza (Fagion) y orden (Fagetalia): *Acer platanoides platanoides* en 7, 11(1.2); *Convallaria majalis* en 6, 11(1.3); *Festuca altissima* en 9(1.2); *Galium odoratum* en 7(1.2), 9(1.1); *Galium rotundifolium* en 2(1.2), 11; *Lysimachia nemorum* en 11(2.2); *Melica uniflora* en 1(1.2), 2(2.3); *Ranunculus serpens* en 10.

Diferenciales de asociación (características de Quercetalia pubescentis): *Amelanchier ovalis* en 5; *Coronilla emerus* en 4(1); *Lilium martagon* en 8, 11; *Quercus gr. cerrioides* en 6[+]; *Viburnum lantana* en 1(1.1), 3.

Características de clase (Querco-Fagetea): *Cephalanthera damasonium* en 3; *Cephalanthera longifolia* en 4; *Clematis vitalba* en 6[+]; *Polygonatum verticillatum* en 8; *Rosa gr. canina* en 2, 6; *Ruscus aculeatus* en 6[+]; *Sanicula europaea* en 1; *Taxus baccata* en 1(2.2); *Tilia platyphyllos platyphyllos* en 3, 6.

Acompañantes presentes en menos de tres inventarios: *Arabis auriculata* en 2; *Arabis pauciflora* en 1, 2; *Arabis turrata* en 3; *Asplenium fontanum fontanum* en 3, 4; *Astrantia major major* en 10(3.1); *Athyrium filix-femina* en 11(2.3); *Campanula rotundifolia* en 1(+.2); *Carex flacca flacca* en 9; *Carex sempervirens* en 4, 6; *Clinopodium vulgare* en 11; *Cruciata glabra* en 1(+.2); *Cystopteris fragilis fragilis* en 11; *Deschampsia flexuosa flexuosa* en 10(+.2); *Dryopteris filix-mas* en 7, 9; *Festuca gautieri scoparia* en 5; *Festuca gr. rubra* en 1, 2; *Galium sp.* en 2; *Gentiana ciliata* en 5; *Geranium sylvaticum sylvaticum* en 11; *Gymnocarpium dryopteris* en 9; *Gymnocarpium robertianum* en 11; *Heracleum sphondylium pyrenaicum* en 3; *Hypericum montanum* en 4, 5[+]; *Lathyrus laevigatus occidentalis* en 11; *Lilium pyrenaicum* en 6; *Lonicera pyrenaica pyrenaica* en 2; *Moneses uniflora* en 2; *Monotropa hypopitys* en 1; *Orthilia secunda* en 5; *Pimpinella saxifraga* en 2; *Pyrola minor* en 3; *Quercus ilex ballota* en 4; *Ramonda myconi* en 4; *Rosa pendulina* en 3; *Rubia peregrina* en 4; *Silene vulgaris* en 11; *Stachys officinalis* en 4; *Teucrium chamaedrys* en 1.

Localidades de la tabla 66:

- 1 [BI0172]: E, Puértolas, La Valle, El Foricón, BH6222, 5-VIII-1992, LV, Font & Soriano, afloramientos rocosos
 - 2 [PI0317]: E, Puértolas, Escuin, puente de los Mallos, BH6321, 3-VI-1998, JLB, 030698A
 - 3 [PI0185]: E, Puértolas, Escuin, c. puente de los Mallos, BH6321, 13-VI-1997, JLB, 130697E
 - 4 [PI0315]: E, Puértolas, Escuin, camino a la surgencia del Yaga, BH6420, 21-V-1998, JLB, 210598G
 - 5 [BI0372]: O, Torla, aparcamiento, YN4126, 20-VII-1992, Carreras
 - 6 [PI0316]: E, Puértolas, Escuin, frente a la surgencia del Yaga, BH6420, 21-V-1998, JLB, 210598H
 - 7 [BI0432]: P, Bielsa, fondo del valle en umbría, BH62, 21-VII-1993, Vigo, piedras gruesas 10%.
 - 8 [PI0183]: B, Torla, entre Ota y puente Oncins, YN3532, 18-VIII-1993, JLB, 180893D
 - 9 [PI0308]: A, Fanlo, entre los barrancos de Capradiza y Arrablo, BH5824, 13-VII-1993, JLB, 130793E
 - 10 [PI0182]: B, Torla, entre Ota y puente Oncins, YN3532, 18-VIII-1993, JLB, 180893C
 - 11 [PI0556]: P, Bielsa, camino al cdo. de Añisclo, BH6127, 25-VI-1997, JLB, 250697B
-